



**FUNDACION
REFORESTEMOS**



**REFORESTACIÓN CON NOTHOFAGUS PUMILIO (LENGA),
RESERVA NACIONAL CERRO CASTILLO,
ABRIL 2017**

INTRODUCCION

Son conocidos los impactos generados por los grandes incendios ocurridos desde inicios del siglo pasado, los cuales afectaron grandes áreas que fueron devastadas por el paso del fuego. La promulgación de la ley de Constitución de la Propiedad Austral a principios del siglo pasado promovió la generación de lúmpias en terrenos agroforestales en la región de Aysén, y el desarrollo de algún tipo de inversión para tener derecho a ser propietario de un terreno en la región. Esto gatilló la quema de bosques en toda la zona sur del país, especialmente en la región de Aysén.

Posterior al incendio del 2011 en el Parque Nacional Torres del Paine (PNTP), nace una campaña de Reforestación llamada "Reforestemos Patagonia", cuyo objetivo se centra en reforestar ecosistemas degradados de la Patagonia, recuperando áreas de alto valor ecológico, y a la vez generar conciencia sobre la importancia que presentan estos lugares para el país y el mundo

A partir del año 2012, la Fundación Reforestemos Patagonia desarrolla un proyecto más amplio y de mayor impacto, donde se proyecta reforestar 1.000.000 de plantas nativas en áreas silvestres protegidas de la región de Aysén y de Magallanes.

La Reserva Nacional Cerro Castillo ubicada a 67 km de Coyhaique es la tercera área protegida que se reforesta en la región de Aysén, y en la cual se ha reforestado con 92.700 Nothofagus pumilio (lenga), mediante el formato de Plantaciones Masivas y Voluntariados.

Para el presente voluntariado se tiene programado establecer 9.000 plantas de lengas, y para lograr esta meta se contará con la ayuda de un grupo de 26 voluntarios, los cuales provienen de distintas regiones del país.

I PLAN DE FORESTACION

1. Identificación de la Zona a Plantar

1.1 Área de forestación

La zona a reforestar se encuentra ubicada en la Reserva Nacional Cerro Catillo (RNCC), en la Región de Aysén, comuna de Coyhaique, situada a 67 km de la capital regional (figura 1).




Figura 1. Ubicación geográfica Reserva Nacional Cerro Castillo.

La reforestación se realizó en un solo rodal, donde se reforestó con 9.000 plantas de *Nothofagus pumilio* (Lenga). La figura 2 muestra el área de reforestación.



Figura 2. Rodal reforestado

1.2 Reconocimiento de terreno

En la identificación de las zonas a plantar participó el equipo técnico de Reforestemos Patagonia, representada por Matías Río, personal de CONAF de la oficina provincial Coyhaique (Julio Moletierri y Marcelo Döerner) y Hernán Velásquez, Administrador de la Reserva Nacional Cerro Castillo (RNCC).

En el trabajo de recopilación de antecedentes se pudo levantar información relevante de las zonas potenciales para realizar proyectos de reforestación (entregado por CONAF), e información de las instituciones que han desarrollado o solicitado sectores para realizar plantaciones de compensación.

En este punto se hace una evaluación del sector, para determinar cuál es la especie que mejor responderá a las condiciones de sitio.

De estos levantamientos de información se generó información sobre el tipo de sustrato, coberturas, condiciones edáficas, red hidrográfica y accesos.

1.3 Especie a reforestar

Nothofagus pumilio (lenga) es una especie nativa de los bosques andinos patagónicos de Chile y Argentina. Crece desde la región del Maule hasta la región de Magallanes en Chile, abarcando desde los 35° a 56° Latitud Sur y desde Neuquén hasta Tierra del fuego en Argentina.

Posee hojas caducas que van desde los 2 a 4 cm de largo, de color verde oscuro, con forma elíptica y borde aserrado. Dependiendo del sitio donde crezca puede alcanzar los 30 m de altura y diámetros mayores a 1 m.

Fuente: Donoso C. 2006. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina, Autoecología. Valdivia, Chile. 678 p

2. Producción de plantas

Las plantas son producidas por Forestal Mininco S.A. cuyas instalaciones se encuentra en la localidad de Villa Mañihuales, región de Aysén. El vivero tuvo una amplia trayectoria en producción de plantas exóticas y en los últimos años está extrayendo plantas nativas para su posterior preparación y aclimatación. Las plantas tienen como procedencia el sector de Río Cajón, en alto Río Ibáñez, a unos 160 km al sur de la ciudad de Coyhaique y a 80 km del sector de reforestación.

Estas plantas son trasladadas al vivero donde son depositadas en contenedores y acondicionadas a factores controlados de temperatura, fertilización y riego durante un año (figura 3).

Las plantas se depositan en cajas rígidas de traslado, en una cantidad estimada de 200 plantas por caja (el número de plantas por caja depende del tamaño y el follaje de estas). A la totalidad de las plantas se les aplicó un gel que permite mantener la humedad durante el traslado.



Figura 3. Izquierda: Naves de aclimatación. Derecha: Embalaje de plantas.

3. Calidad de plantas

Los requerimientos solicitados por Reforestemos Patagonia para el efectivo desarrollo del bosque futuro, dicen relación a que se debe cumplir ciertas características, tales como, tener la forma del contenedor que las soportó en la etapa de vivero, raíces finas o secundarias a la vista, el desarrollo radicular debe ser abundante colonizando la cavidad del contenedor. Las plantas deben observarse sin daños en el tallo por raspadura, ni deben presentar ningún tipo de quebraduras que pudiesen influir en la merma de la planta una vez establecida.

La relación masa radicular – tallo no debe ser mayor de 1:2 para asegurar un equilibrio en el traslado de nutrientes y agua. Por lo demás , el tallo debe estar lignificado con un diámetro no menor a 3 milímetros (mm), de esta manera se favorecen las posibilidades de supervivencia en condiciones extremas de heladas y nieve (figura 4).

Las plantas con daños mecánicos o que no cumplan las condiciones mínimas solicitadas, serán devueltas al vivero para su reposición.



Figura 4. Planta de Lengua con los requerimientos solicitados.

II METODOLOGIA DE PLANTACION

1. Esquema de plantación

Se realizó una plantación que considera una densidad de 3.000 plantas por hectárea (pl/ha), distribuidas homogéneamente. La plantación no se realizó en hileras, como tradicionalmente se hace, se utilizó un sistema de plantación en núcleos, en el cual se establecieron 100 plantas de lenga. El distanciamiento mínimo entre plantas dentro del núcleo de plantación es de 30 cm aproximadamente.

2. Procedimientos

El Programa de Voluntariado comenzó con una capacitación técnica, donde se profundizó en los aspectos técnicos que se requieren para llevar a cabo una correcta plantación. La capacitación fue realizada en el Quincho que tiene CONAF en la RNCC, y se dividió en una bienvenida dada por parte del personal de CONAF, una charla teórica y en un trabajo práctico.

Cada voluntario utilizó una pala recta que le permitió mullir el suelo (cultivo) y dejar un espacio en el centro para depositar una planta (figura 5). Se depositó la raíz de la planta quedando la parte superior del pilón a ras del suelo, llenándose luego los espacios laterales con el sustrato, procurando que no queden bolsas de aire y que el suelo quede bien compactado. La planta debe quedar firme al suelo, y no debe salirse, ni moverse si el encargado forestal o supervisor directo le da un tirón a esta, con el fin de supervisar la correcta plantación.



Figura 5 . Voluntarios en faena de establecimiento de plantas

3. Control de malezas

Esta faena consiste en la eliminación y/o reducción de vegetales competidores con las especies a establecer, evitando la competencia por agua, luz y nutrientes. Esta actividad es necesaria para el adecuado establecimiento y desarrollo de la plantación. No se realizó control químico de malezas.

El control de malezas se justifica técnicamente considerando las restricciones topográficas del área. Para un adecuado control, se deben eliminar las malezas de hierbas en una casilla de 30x30 centímetros (cm), donde se ubicará la planta. Los matorrales que se encuentran en el sector de plantación no se eliminarán y se utilizarán para la protección que puedan entregar a la nueva planta.

4. Preparación de suelo

Esta faena consiste en modificar la capa superficial del suelo para mejorar sus condiciones físicas, lo que permite facilitar el establecimiento de las plantas. El suelo debe quedar bien mullido y libre de malezas en una casi lla de plantación de 30 x 30 cm, con una profundidad de 25 cm., de esta manera el suelo es capaz de retener mejor el agua, por lo tanto, las plantas tienen la posibilidad de un mejor desarrollo o radicular.

5. Protectores individuales

El principal riesgo para la plantación es la presencia de *Lepus europeus* (Liebre) en el sector a reforestar, cuyo daño puede llegar a ser significativo, ya que cortan el ápice de las plantas. En el sector a reforestar, hay mediana a baja presencia de liebres, debido a la altitud en que se encuentran ubicados, sin embargo, a estas plantas se les instalará un sistema de protección individual (ver figura 6), para asegurar una mejor protección de las plantas contra las liebres, heladas y nieve (protección lateral).



Figura 6: Protectores individuales instalados en faena de plantación

6. Equipo de trabajo

La reforestación estuvo a cargo de 24 voluntarios provenientes de distintas partes del país, más 2 jefes de cuadrilla (voluntarios que han venido a en otros programas), los cuales estuvieron en la zona de reforestación durante 4 días (20 al 23 de abril) . El equipo de voluntarios estuvo a cargo de un equipo profesional liderado por Matías Río y también por un equipo técnico conformado por Darwin Zapata . Los rostros que nos acompañaron en esta oportunidad, fueron Javiera Contador y Renata Ruiz (ver figura 7).



Figura 7 . Equipo proyecto de re forestación, octubre 2015

7. Consideraciones posteriores

Con el fin de monitorear el adecuado establecimiento de la plantación, será necesario mantener una vigilancia durante los meses posteriores a la plantación , mediante recorridos periódicos que permitan corregir problemas que pueden estar relacionados con plantas dobladas por el peso de la nieve, ingreso de animales , o para definir de manera temprana posibles problemas de mortalidad en la plantación y tomar las medidas que sean necesarias.



FUNDACION
REFORESTEMOS